

対象患者： 尿路上皮癌

レジメン名： 尿路4 ジェムザール+アクブラ療法

1コースの日数： 28日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day									
						1	2	~	8	~	15	~	28		
1	大塚生食注 デカドロン注射液	100mL 6.6mg	1 1	点滴静注	30分	○									
2	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m ²	1 1	点滴静注	30分	○									
3	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○									
4	大塚生食注 グラニセトロン静注液 デカドロン注射液	100mL 3mg 6.6mg	1 1 2	点滴静注	30分		○								
5	テルモ生食 アクブラ静注用	500mL 70mg/m ²	1 1	点滴静注	60分		○								
6	テルモ生食	500mL	1	点滴静注	60分		○								
7	テルモ生食	500mL	1	点滴静注	60分		○								
8	大塚生食注 デカドロン注射液	100mL 6.6mg	1 1	点滴静注	30分				○						
9	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m ²	1 1	点滴静注	30分				○						
10	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分				○						
11	大塚生食注 デカドロン注射液	100mL 6.6mg	1 1	点滴静注	30分						○				
12	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m ²	1 1	点滴静注	30分						○				
13	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分						○				
14															
15															

備考：