

対象患者： 尿路上皮癌

レジメン名： 尿路8 バドセブ療法

1コースの日数： 28日間

| No. | 抗がん剤名<br>(溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量         | 1回量    | 投与方法 | 投与時間 | Day |   |   |   |    |   |    |
|-----|-------------------------|----------------|--------|------|------|-----|---|---|---|----|---|----|
|     |                         |                |        |      |      | 1   | ～ | 8 | ～ | 15 | ～ | 28 |
| 1   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液       | 100mL<br>6.6mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 2   | 大塚生食注<br>バドセブ点滴静注用      | 50mL<br>1.25mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 3   | 大塚生食注                   | 50mL           | 1      | 点滴静注 |      | ○   |   |   |   |    |   |    |
| 4   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液       | 100mL<br>6.6mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 5   | 大塚生食注<br>バドセブ点滴静注用      | 50mL<br>1.25mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 6   | 大塚生食注                   | 50mL           | 1      | 点滴静注 |      |     |   | ○ |   |    |   |    |
| 7   | 大塚生食注<br>デカドロン注射液       | 100mL<br>6.6mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 8   | 大塚生食注<br>バドセブ点滴静注用      | 50mL<br>1.25mg | 1<br>1 | 点滴静注 |      |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 9   | 大塚生食注                   | 50mL           | 1      | 点滴静注 |      |     |   |   |   | ○  |   |    |
| 10  |                         |                |        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |
| 11  |                         |                |        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |
| 12  |                         |                |        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |
| 13  |                         |                |        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |
| 14  |                         |                |        |      |      |     |   |   |   |    |   |    |

備考：