

対象患者： 乳癌

レジメン名： 乳40 キイトルーダ+ジェムザール+カルボプラチン療法

1コースの日数： 21日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day				
						1	～	8	～	21
1	大塚生食注	100ml	1	点滴静注	30分	○				
2	大塚生食注 キイトルーダ点滴静注	100ml 200mg/body	1	点滴静注	30分	○				
3	大塚生食注	50ml	1	点滴静注	10分	○				
4	大塚生食注 グラニセロン静注液 デカドロン注射液	100ml 3mg 6.6mg	1 1 1	点滴静注	30分	○				
5	大塚生食注 ジェムザール注射用	100ml 1000mg/m ²	1	点滴静注	30分	○				
6	テルモ生食 カルボプラチン点滴静注液	500ml AUC 2	1	点滴静注	60分	○				
7	大塚生食注	50ml	1	点滴静注	10分	○				
8	大塚生食注 グラニセロン静注液 デカドロン注射液	100ml 3mg 6.6mg	1 1 1	点滴静注	30分			○		
9	大塚生食注 ジェムザール注射用	100ml 1000mg/m ²	1	点滴静注	30分			○		
10	テルモ生食 カルボプラチン点滴静注液	500ml AUC 2	1	点滴静注	60分			○		
11	大塚生食注	50ml	1	点滴静注	10分			○		
12										
13										
14										
15										

備考：