

対象患者： 卵巢癌

レジメン名： 卵巢2 イリノテカン療法

1コースの日数： 28日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day						
						1	～	8	～	15	～	28
1	大塚生食注 デカドロン注射液 グラニセロン静注液	100mL 6.6mg 3mg	1 1 1	点滴静注	30分	○						
2	大塚糖液 5 % イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250mL 100mg/m ²	1 1	点滴静注	90分	○						
3	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○						
4	大塚生食注 デカドロン注射液 グラニセロン静注液	100mL 6.6mg 3mg	1 1 1	点滴静注	30分			○				
5	大塚糖液 5 % イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250mL 100mg/m ²	1 1	点滴静注	90分			○				
6	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分			○				
7	大塚生食注 デカドロン注射液 グラニセロン静注液	100mL 6.6mg 3mg	1 1 1	点滴静注	30分					○		
8	大塚糖液 5 % イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250mL 100mg/m ²	1 1	点滴静注	90分					○		
9	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分					○		
10												
11												
12												
13												
14												
15												

備考：