

対象患者： 非ホジキンリンパ腫

レジメン名： 非ホジ2 ポライビー+R-CHP(42kg以上・初回) (ボララミン・カロナール・プレドニン・アロカリス)

1コースの日数： 21日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day			
						1	2	～	21
1	大塚生食注	100mL	1	点滴静注	30分	○			
2	テルモ生食 リツキシマブ注	375mg/m ²	1 1	点滴静注	指示による	○			
3	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○			
4	大塚生食注 パロノセトロン静注 アロカリス点滴静注	100mL 0.75mg 235mg	1 1 1	点滴静注	30分		○		
5	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分		○		
6	大塚生食注 ポライビー点滴静注用	100mL 1.8mg/kg	1 1	点滴静注	90分		○		
7	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分		○		
8	テルモ生食 注射用エンドキサン	500mL 750mg/m ²	1 1	点滴静注	120分		○		
9	大塚生食注 ドキソルビシン塩酸塩注射用	50mL 50mg/m ²	1 1	点滴静注	30分		○		
10	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分		○		
11									
12									
13									
14									
15									

備考：