

対象患者： 大腸癌

レジメン名： 大13 ベバシズマブ+mFOLFOX6（2回目以降）（アロカリス）

1コースの日数： 14日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day		
						1	～	14
1	大塚生食注 ベバシズマブBS点滴静注	100mL 10mg/kg	1	点滴静注	60分	○		
2	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○		
3	大塚生食注 パロノセトロン静注 デカドロン注射液 アロカリス点滴静注	100mL 0.75mg 3.3mg 235mg	1 1 1 1	点滴静注	30分	○		
4	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○		
5	大塚糖液 5 % オキサリプラチン点滴静注液	250mL 85mg/m ²	1	点滴静注	120分	○		
6	大塚糖液 5 % レボホリナート点滴静注用	250mL 200mg/m ²	1	点滴静注	120分	○		
7	5 %糖液キットH フルオロウラシル注	50mL 300mg/m ²	1	点滴静注	5分	○		
8	テルモ生食 フルオロウラシル注	160mL 2000mg/m ²	1	点滴静注	46時間	○		
9	生食注シリンジ	10mL	1	点滴静注		○		
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								

備考：
オキサリプラチン点滴静注液とレボホリナート点滴静注用は同時投与