対象患者: 大腸癌

レジメン名: 大31 TS-1+ベバシズマブ療法 (2回目以降)

1コースの日数: 42日間

| No. | 抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む) | 標準的投与量 | 1回量 | 投与方法 | 投与時間 | Day | | | | | | | |
|-----|-------------------------|--------|-----|------|------|-----|---|----|---|----|---|----|--|
| | | | | | | 1 | ~ | 15 | ~ | 29 | ~ | 42 | |
| 1 | 大塚生食注 | 100mL | 1 | 点滴静注 | 60分 | 0 | | | | | | | |
| | ベバシズマブBS点滴静注 | 5mg/kg | | | | | | | | | | | |
| 2 | 大塚生食注 | 50mL | 1 | 点滴静注 | 10分 | 0 | | | | | | | |
| 3 | 大塚生食注 | 100mL | 1 | 点滴静注 | 60分 | | | 0 | | | | | |
| | ベバシズマブBS点滴静注 | 5mg/kg | | | | | | | | | | | |
| 4 | 大塚生食注 | 50mL | 1 | 点滴静注 | 10分 | | | 0 | | | | | |
| 5 | 大塚生食注 | 100mL | 1 | 点滴静注 | 60分 | | | | | 0 | | | |
| | ベバシズマブBS点滴静注 | 5mg/kg | | | | | | | | | | | |
| 6 | 大塚生食注 | 50mL | 1 | 点滴静注 | 10分 | | | | | 0 | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | |

| 11 | | | | | | |
|----|--|--|--|--|--|--|
| 12 | | | | | | |
| 13 | | | | | | |
| 14 | | | | | | |
| 15 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 備考 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |