

対象患者： 膵臓癌

レジメン名： 膵2 ジェムザール療法

1コースの日数： 28日間

No.	抗がん剤名 (溶解液、支持療法等も含む)	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day						
						1	~ 8	~ 15	~ 28			
1	グラニセトロン点滴静注バッグ デカドロン注射液	3mg 6.6mg	1 1	点滴静注	30分	○						
2	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	1	点滴静注	30分	○						
3	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○						
4	グラニセトロン点滴静注バッグ デカドロン注射液	3mg 6.6mg	1 1	点滴静注	30分			○				
5	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	1	点滴静注	30分			○				
6	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分			○				
7	グラニセトロン点滴静注バッグ デカドロン注射液	3mg 6.6mg	1 1	点滴静注	30分					○		
8	大塚生食注 ジェムザール注射用	100mL 1000mg/m <sup>2</sup>	1	点滴静注	30分					○		
9	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分					○		
10												
11												
12												
13												
14												
15												

備考：