

対象患者： 膵臓癌

レジメン名： 膵7 FOLFIRINOX療法（1st line）（アロカリス）

1コースの日数： 14日間

No.	抗がん剤名 （溶解液、支持療法等も含む）	標準的投与量	1回量	投与方法	投与時間	Day		
						1	～	14
1	大塚生食注 パロノセトロン静注 デカドロン注射液 アロカリス点滴静注	100mL 0.75mg 3.3mg 235mg	1 1 1 1	点滴静注	30分	○		
2	大塚生食注	50mL	1	点滴静注	10分	○		
3	大塚糖液 5 % オキサリプラチン点滴静注液	250mL 85 mg/m ²	1	点滴静注	120分	○		
4	大塚糖液 5 % イリノテカン塩酸塩点滴静注液	250mL 180 mg/m ²	1	点滴静注	90分	○		
5	大塚糖液 5 % レボホリナート点滴静注用	250mL 200 mg/m ²	1	点滴静注	120分	○		
6	5 %糖液キットH フルオロウラシル注	50mL 400 mg/m ²	1	点滴静注	5分	○		
7	テルモ生食 フルオロウラシル注	160mL 2400mg/m ²	1	点滴静注	46時間	○		
8	生食注シリンジ	10mL	1	点滴静注		○		
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

備考：

イリノテカン塩酸塩点滴静注液とレボホリナート点滴静注用は同時投与